

**Suddivisione della popolazione in categorie di progressivo impegno clinico
In base ai seguenti parametri:**

- Documentazione virologica
- Elevato sospetto clinico-epidemiologico
- valutazione obiettiva (parametri vitali: polso PA, FR, TC)
- valutazione delle comorbidità (età, patologie e terapie concomitanti)

Stadio I: paziente pauci-sintomatico, non polmonite (MEWS 0-1)

Definizione:

- TNF positive od elevato sospetto clinico-epidemiologico
- febbre $\leq 38,0$ °C
- PA e FC nella norma
- assenza di sintomi sistemici di disidratazione o sepsi
- tosse secca, rinite, faringodinia o diarrea lieve
- no dispnea
- pulsossimetria normale
- Ecografia (opzionale) negativa per polmonite

Stadio II: polmonite lieve (MEWS 2-3)

Definizione:

- TNF positive od elevato sospetto clinico-epidemiologico
- febbre ≥ 38 °C
- FC < 90bpm, PA max > 100
- FR > 16 e < 28 atti/min
- tosse, dispnea da lieve a moderata

- pulsiossimetria non inferiore al 93%
- reperti obiettivi polmonari (crepitii fini bilaterali)
- Ecografia (opzionale) compatibile con polmonite lieve.

LA TERAPIA DOMICILIARE (ALLEGATO 1) E' RACCOMANDATA NEI PAZIENTI CLASSIFICATI COME STADIO 1 E 2