

- 1. Riordinare la sequenza operativa della pulizia della protesi dentaria**
  - A. Osservare il cavo orale e riferire l'eventuale presenza di alterazioni della mucosa
  - B. Spazzolare tutta la protesi con spazzolino e dentifricio, osservare e spazzolare dove vi è depositato il calcare
  - C. Porgere al paziente il materiale per completare l'igiene della bocca (lavaggio degli eventuali denti naturali, massaggio delle gengive con spazzolino morbido, sciacqui con Collutorio)
  - D. Sciacquare sotto acqua corrente tiepida
  - E. Riposizionare la protesi e verificare con il paziente che la protesi abbia aderito alle gengive
  - F. Informare l'infermiere di eventuali anomalie del cavo orale e di eventuali presidi in esaurimento
  - G. Lavarsi le mani e indossare i guanti
  - H. Registrare la prestazione
  - I. Invitare o aiutare il paziente a togliersi la protesi: aiutandosi con una garza, afferrare la protesi tra pollice e indice a livello degli incisivi centrali, compiere dei piccoli movimenti in senso verticale per facilitarne il distacco, in caso di difficoltà afferrare lateralmente la protesi tra pollice ed indice di ambedue le mani
  - J. Verificare che la protesi sia pulita e che non si notino depositi di calcare
  - K. Tenere saldamente in mano la protesi, lavorando con acqua corrente tiepida sopra un recipiente per evitare inconvenienti in caso di caduta accidentale
  
- 2. Posizionamento del paziente emiplegico da decubito laterale sul lato non plegico da decubito supino, per prevenire vizi posturali.**

**Riordinare le fasi.**

- A. Allineare tutti i segmenti del letto e controllare che sia frenato. Variare la posizione del letto secondo la propria statura.
  - B. Scoprire il paziente.
  - C. Sostenendo con una mano l'anca e con l'altra il cingolo scapolare, effettuare la rotazione in posizione supina.
  - D. Avvicinare il dispositivo di chiamata dal lato non plegico.
  - E. Chiedere al paziente di portarsi al centro del letto, quindi di alzare il bacino poggiando sull'emisoma non plegico. Vanno evitati sfregamenti sul lato di appoggio e trazioni dell'arto plegico.
  - F. Posizionare un cuscino sotto la testa.
  - G. Togliere i cuscini.
  - H. Posizionare un cuscino sotto il piede per mantenere l'articolazione tibio-tarsica a 90° circa.
  - I. Prevenire l'extrarotazione della gamba plegica sostenendo lateralmente con dei cuscini il gluteo, la coscia ed il ginocchio.
  - J. Coprire il paziente e porre l'arto superiore plegico in posizione di scarico, quindi polso più elevato del gomito e gomito più elevato della spalla, in leggera flessione.
  - K. Porsi dal lato di decubito laterale del paziente
  - L. Sistemare all'archetto alza- coperte.
  
- 3. Il candidato/a trovandosi alla data odierna in servizio presso la RSA di Sinalunga deve effettuare le attività di sua pertinenza in relazione alla situazione di seguito presentata:**

**il sig. Rossi Bramante di anni 90 è ad oggi residente presso la RSA di Sinalunga.**

- Presenta agitazione psicomotoria e grave forma di Demenza Senile
  - Presenta pregresse fratture al femore sx e al braccio dx
  - Presenta difficoltà nella deambulazione e deve essere aiutato negli spostamenti da un Operatore
  - I familiari non hanno autorizzato l'utilizzo di procedure contenitive
  - Bramante si alza continuamente dalla sedia
- 4. Il candidato/a illustri trovandosi ad operare presso la RSA di Sinalunga la Gestione dei rifiuti in presenza di caso sospetto o confermato COVID-19 in base alle normative vigenti**
  
  - 5. Il candidato/a descriva quali siano le modalità di accesso al domicilio dell'utente di un addetto all'assistenza domiciliare durante il periodo Covid in base alle normative vigenti.**